



Tidal Grow® Chroma boosts plants' natural defense mechanisms to abiotic stress while stimulating growth and vigour. Tidal Grow® Chroma also enhances plant survival and yield in times of heat/cold stress and drought, allowing plants to grow with less water.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS	
Chitosan	5.75%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND ANIMALS

Caution: this product contains crustaceans. Adverse reactions may occur in sensitive persons. May cause skin and eye irritation. If skin contact occurs, wash with soap and water. Wear dust mask, protective gloves and safety goggles when applying product. If allergic reaction occurs, seek medical attention.

**REGISTRATION NUMBER 2024407S FERTILIZERS ACT
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 2024407S LOI SUR LES ENGRAIS**

NET WEIGHT / POIDS NET

9.8 kg (9.46 L) ____ 9,8 kg (9,46 L)
1015.0 kg (984 L) ____ 1015,0 kg (984 L)

Tidal Vision Products, Inc. DBA Tidal Grow® AgriScience
3710 Iron Gate Road, Bellingham, WA 98226 USA

TidalGrowAg.com | +1.360.603.7676



**THIS PAGE IS
INTENTIONALLY
LEFT BLANK**

FIRST AID	
IF INGESTED	Clean mouth with water and afterward drink plenty of water.
IF ON SKIN OR CLOTHING:	Remove contaminated clothing. Rinse skin with soap and water.
IF INHALED:	Remove to fresh air.
IF IN EYES:	Rinse thoroughly with water for at least 15 minutes, lifting lower and upper eyelids. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes. Consult a physician.

STORAGE AND DISPOSAL:

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. Store in the original container in a cool, dry area away from children and pets. Do not reuse empty container. If empty: Offer for recycling if available or discard in a sanitary landfill. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

MANUFACTURED BY:

Tidal Vision Products, Inc. DBA Tidal Grow® AgriScience
3710 Iron Gate Road, Bellingham, WA 98226
TidalGrowAg.com | +1-360-603-7676



NOTE TO USER:

Unintentional consequences such as crop injury may result due to environmental or growing conditions, manner of use, or application. In some cases, tank mixing with pest control products can result in reduced pesticide efficacy or increased host crop injury. The user should contact the company responsible for the pest control product before applying any tank mix.

THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

DIRECTION FOR USE:

Tidal Grow® Chroma can be used as a foliar spray, soil drench, or can be applied via chemigation methods (such as center pivot, drip/trickle, sprinkler, furrow). Tidal Grow Chroma can be applied to crops at any time during the growing season including preplant, pre-emergence, post-emergence, and in-season, up to and including the day of harvest. For best results apply the product early in the morning or late in the afternoon. Tidal Grow® Chroma is tank-mixable with most chemicals. The pH of the final solution should be below 7 for best results; perform a compatibility jar test prior to mixing with other chemicals. Not for aquatic use.

APPLICATION RATES:

CROP	APPLICATION METHOD	APPLICATION TIMING	RATE	COMMENTS
Soybeans	In-Furrow	At planting	Apply 580 mL of product per hectare	Check compatibility with other in-furrow inputs used in same tank.
	Foliar (ground spray, pivot, etc.)	Starting at V3 - V5	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 100 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed. Apply up to 10 applications per season.
	Foliar (aerial)	Starting at V3 - V5	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 20 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed. Apply up to 10 applications per season.
Corn (field, sweet, popcorn)	In-Furrow	At planting	Apply 580 mL of product per hectare	Check compatibility with other in-furrow inputs used in same tank.
	Foliar (ground spray, pivot, etc.)	Starting at V2 - V4	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 100 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed. Apply up to 10 applications per season.
	Foliar (aerial)	Starting at V2 - V4	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 20 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed. Apply up to 10 applications per season.

APPLICATION RATES (continued):

CROP	APPLICATION METHOD	APPLICATION TIMING	RATE	COMMENTS
Cereal Grains (non-corn, such as Barley, Buckwheat, Millet, Oats, Rice, Rye, Sorghum, Triticale, Wheat)	In-Furrow	At planting	Apply 580 mL of product per hectare	Check compatibility with other in-furrow inputs used in same tank.
	Foliar (ground spray, pivot, etc.)	Starting as early as 3 - 5 leaf stage	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 100 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed up to 10 times per season.
	Foliar (aerial)	Starting as early as 3 - 5 leaf stage	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 20 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed up to 10 times per season.
Roots/Tubers (such as potatoes, sweet potatoes, sugar beets, carrots.)	In-Furrow	At planting	Apply 580 mL of product per hectare	Check compatibility with other in-furrow inputs used in same tank.
	Foliar (ground spray, pivot, etc.)	Starting as early as 14 days after emergence	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 100 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed. Apply up to 10 applications per season.
	Foliar (aerial)	Starting as early as 14 days after emergence	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 20 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed. Apply up to 10 applications per season.
Turfgrass (such as Sod Farms, Lawns, Golf Courses)	Soil Treatment	Between plantings or during any growth stage	Apply 1170 mL of product per hectare	Check compatibility with other soil treatments in same tank. Can be applied via spray, chemigation, or other means.
	Foliar (ground spray, pivot, etc.)	Starting as early as 14 days after emergence	Apply 580 - 1170 mL of product per hectare	Use at least 100 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed up to 16 times per year.

APPLICATION RATES (continued):

CROP	APPLICATION METHOD	APPLICATION TIMING	RATE	COMMENTS
Berries & Small Fruit (such as Aronia Berries, Blackberries, Blueberries, Currants, Elderberries, Gooseberries, Grapes, Huckleberries, Kiwifruits, Loganberries, Mulberries, Raspberries, Strawberries)	Soil Treatment	Between replanting or during any growth stage (including dormant)	Apply 1170 mL of product per hectare	Check compatibility with other soil treatment inputs used in same tank. Can be applied via spray, chemigation, or other means. Re-apply once per month or as needed up to 13 times annually.
	Foliar (ground spray, pivot, etc.)	Starting as early as budswell or budburst	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 100 liters of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed up to 26 times annually.
	Foliar (aerial)	Starting as early as budswell or budburst	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 20 liters of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed up to 26 times annually.
Flowering Plants (such as Shade and Flowering Trees, Woody Ornamentals, Hemp, Ornamental Flowers)	Soil Treatment (greenhouse or outdoor)	During any growth stage	Apply 5 mL of product per 100 m ² of canopy	Check compatibility with other soil treatment inputs used in same tank. Apply via spray, chemigation, drip, or other means. Re-apply once per month or as needed up to 13 times annually.
	Foliar Spray (greenhouse or outdoor)	Up to one week before harvest	Apply 10 mL of product per 100 m ² of canopy	Use minimum spray volume to cover foliage. Spray tops and bottoms of leaves for best results. Re-apply once every 2 weeks or as needed up to 26 times annually.

THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

APPLICATION RATES (continued):

CROP	APPLICATION METHOD	APPLICATION TIMING	RATE	COMMENTS
Tree Nuts	Soil Treatment	Between replanting or during any growth stage (including dormant)	Apply 1170 mL of product per hectare	Check compatibility with other soil treatment inputs used in same tank. Can be applied via spray, chemigation, or other means. Re-apply once every 2 weeks or as needed up to 13 times per year.
	Foliar (ground spray, pivot, etc.)	Starting as early as bud formation	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 100 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed.
	Foliar (aerial)	Starting as early as bud formation	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 20 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed.
Tree Fruits (non-citrus, such as Apples, Apricots, Crabapples, Loquats, Nectarines, Oriental Pears, Peaches, Pears, Plums, Prunes, Quinces, Sweet Cherries, Tart Cherries)	Soil Treatment	Between replanting or during any growth stage (including dormant)	Apply 1170 mL of product per hectare	Check compatibility with other soil treatment inputs used in same tank. Can be applied via spray, chemigation, or other means. Re-apply once every 2 weeks or as needed up to 13 times annually.
	Foliar (ground spray, pivot, etc.)	Starting as early as bud formation	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 100 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed.
	Foliar (aerial)	Starting as early as bud formation	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 20 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed.

THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

APPLICATION RATES (continued):

CROP	APPLICATION METHOD	APPLICATION TIMING	RATE	COMMENTS
Field or Greenhouse Grown Vegetables (such as Artichokes, Broccoli, Brussels sprouts, Cabbage, Carrots, Cauliflower, Cucumber, Eggplants, Garlic, Leafy Vegetables, Onion, Pumpkin, Squash)	In-Furrow	At planting	Apply 580 mL of product per hectare	Check compatibility with other in-furrow inputs used in same tank.
	Foliar (ground spray, pivot, etc.)	Starting as early as 14 days after emergence	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 100 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed up to 26 times annually.
	Foliar (aerial)	Starting as early as 14 days after emergence	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 20 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed up to 26 times annually.
Legumes (non-soybean, such as Broad Beans, Chickpeas, Lentils, Peas, Pigeon Peas, various Lupinus spp., various Dry Beans beans)	In-Furrow	At planting	Apply 580 mL of product per hectare	Check compatibility with other in-furrow inputs used in same tank.
	Foliar (ground spray, pivot, etc.)	Starting as early as 14 days after emergence	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 100 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed up to 26 times annually.
	Foliar (aerial)	Starting as early as 14 days after emergence	Apply 440 - 1600 mL of product per hectare	Use at least 20 litres of total spray volume per hectare. Re-apply once every 2 weeks or as needed up to 26 times annually.

THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK



Tidal Grow® Chroma renforce les mécanismes naturels de défense des plantes contre le stress abiotique tout en stimulant leur croissance et leur vigueur. Tidal Grow® Chroma améliore également la survie et le rendement des plantes en cas de stress dû à la chaleur, au froid et à la sécheresse, leur permettant de pousser avec moins d'eau.

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Chitosane 5,75%

Garder hors de la portée des enfants et des animaux

Avertissement: Ce produit contient des crustacés. Des réactions indésirables peuvent se produire chez les personnes sensibles. En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon. Peut provoquer une irritation des yeux. Porter un masque anti-poussière, des lunettes de protection et des gants. En cas de réaction allergique, consulter un médecin.

PREMIERS SOINS	
EN CAS D'INGESTION :	Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS :	Enlever les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau et du savon.
EN CAS D'INHALATION :	Sortir à l'air frais.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :	Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières inférieures et supérieures. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes. Consulter un médecin.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION :

Ne pas contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux lors de l'entreposage ou de l'élimination. Conserver dans le récipient d'origine dans un endroit frais et sec, hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas réutiliser le récipient vide. S'il est vide : proposer au recyclage si possible ou jeter dans une décharge contrôlée. S'il est partiellement rempli : appelez votre agence locale de gestion des déchets solides pour obtenir des instructions sur l'élimination. Ne jamais jeter le produit non utilisé dans une conduite d'égout intérieure ou extérieure.

MANUFACTURED BY:

Tidal Vision Products, Inc. DBA Tidal Grow® AgriScience
3710 Iron Gate Road, Bellingham, WA 98226
TidalGrowAg.com | +1-360-603-7676



NOTE POUR L'UTILISATEUR :

Des conséquences involontaires telles que des dommages aux cultures peuvent survenir en raison des conditions environnementales ou de croissance, du mode d'utilisation ou d'application. Dans certains cas, le mélange de produits de lutte antiparasitaire peut entraîner une efficacité réduite des pesticides ou une augmentation des dommages aux cultures hôtes. L'utilisateur devrait contacter l'entreprise responsable du produit de lutte antiparasitaire avant d'appliquer tout mélange dans le réservoir. reduced pesticide efficacy or increased host crop injury. The user should contact the company responsible for the pest control product before applying any tank mix.

THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

MODE D'EMPLOI :

Tidal Grow® Chroma peut être utilisé en pulvérisation foliaire, en arrosage du sol ou peut être appliqué par des méthodes de chimigation (arroseur rotatif, irrigation goutte à goutte, arroseur automatique, sillon). Tidal Grow® Chroma peut être appliqué sur les cultures à tout moment de la saison de croissance, y compris en préplantation, en pré-levée, en post-levée et en cours de saison, jusqu'au jour de la récolte inclus. Pour de meilleurs résultats, appliquer le produit tôt le matin ou en fin d'après-midi. Tidal Grow® Chroma peut être mélangé dans un réservoir avec la plupart des produits chimiques. Le pH de la solution finale doit être inférieur à 7 pour obtenir les meilleurs résultats ; effectuer un test de compatibilité dans un bocal avant de mélanger le produit à d'autres produits chimiques. Ne pas utiliser en milieu aquatique.

DOSES D'APPLICATION :

CULTURE	MÉTHODE D'APPLICATION	PÉRIODE D'APPLICATION	DOSE	COMMENTAIRES
Soya	Dans la raie de semis	À la plantation	Appliquer 580 ml de produit par hectare	Vérifier la compatibilité avec d'autres intrants pour raie du semis utilisés dans le même réservoir.
	Foliaire (pulvérisation au sol, rotatif, etc.)	Commencer à partir de V3 - V5	Appliquer 440 - 1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 100 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins. Effectuer jusqu'à 10 applications par saison.
	Foliaire (aérien)	Commencer dès V3 - V5	Appliquer 440 - 1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 20 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins. Effectuer jusqu'à 10 applications par saison.

THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

CULTURE	MÉTHODE D'APPLICATION	PÉRIODE D'APPLICATION	DOSE	COMMENTAIRES
Maïs (de plein champ, doux, à éclater)	Dans la raie de semis	À la plantation	Appliquer 580 ml de produit par hectare	Vérifier la compatibilité avec d'autres intrants pour raie de semis utilisés dans le même réservoir.
	Foliaire (pulvérisation au sol, rotatif, etc.)	Commencer à partir de V2 - V4	Appliquer 440 - 1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 100 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins. Effectuer jusqu'à 10 applications par saison.
	Foliaire (aérien)	Commencer dès V2 - V4	Appliquer 440 - 1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 20 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins. Effectuer jusqu'à 10 applications par saison.
Grains céréaliers (autres que le maïs, telles que l'orge, le sarrasin, le millet, l'avoine, le riz, le seigle, le sorgho, le triticale, le blé)	Dans la raie de semis	À la plantation	Appliquer 580 ml de produit par hectare	Vérifier la compatibilité avec d'autres intrants pour raie de semis utilisés dans le même réservoir.
	Foliaire (pulvérisation au sol, rotatif, etc.)	Commencer dès le stade foliaire 3 - 5	Appliquer 440 - 1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 100 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 10 fois par saison.
	Foliaire (aérien)	Commencer dès le stade foliaire 3 - 5	Appliquer 440 - 1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 20 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 10 fois par saison.

THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

CULTURE	MÉTHODE D'APPLICATION	PÉRIODE D'APPLICATION	DOSE	COMMENTAIRES
Racines/tubercules (pommes de terre, patates douces, betteraves sucrières, carottes, etc.)	Dans la raie de semis	À la plantation	Appliquer 580 ml de produit par hectare	Vérifier la compatibilité avec d'autres intrants pour raie du semis utilisés dans le même réservoir.
	Foliaire (pulvérisation au sol, rotatif, etc.)	Commencer dès 14 jours après la levée	Appliquer 440 - 1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 100 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 10 fois par saison.
	Foliaire (aérien)	Commencer dès 14 jours après la levée	Appliquer 440 - 1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 20 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 10 fois par saison.
Gazons (tels que les gazons en plaque, les pelouses, les terrains de golf)	Traitement des sols	Entre les plantations ou à n'importe quel stade de croissance	Appliquer 1170 ml de produit par hectare	Vérifier la compatibilité avec d'autres traitements des sols dans le même réservoir. Peut être appliqué par pulvérisation, chimigation ou autres moyens.
	Foliaire (pulvérisation au sol, rotatif, etc.)	Commencer dès 14 jours après la levée	Appliquer 580 - 1170 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 100 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 10 fois par saison.

THIS SPACE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

CULTURE	MÉTHODE D'APPLICATION	PÉRIODE D'APPLICATION	DOSE	COMMENTAIRES
Baies et petits fruits cultivés en plein champ ou sous serre (comme les d'aronias, les mûres sauvages, les bleuets, les gadelles, les baies de sureau, les groseilles à maquereau, les raisins, les myrtilles, les kiwis, les mûres de Logan, les mûres, les framboises, les fraises)	Traitement des sols	Entre deux replantations, pendant la transplantation ou à n'importe quel stade de la croissance	Appliquer 1170 ml de produit par hectare	Vérifier la compatibilité avec d'autres produits de traitement des sols utilisés dans le même réservoir. Peut être appliqué par pulvérisation, chimigation ou d'autres moyens. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 13 fois par an.
	Foliaire (pulvérisation au sol, rotatif, etc.)	Commencer dès le stade du bourgeonnement ou du débourrement	Appliquer 440-1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 100 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 26 fois par an.
	Foliaire (aérien)	Commencer dès le stade du bourgeonnement ou du débourrement	Appliquer 440-1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 20 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 26 fois par an.
Plantes à fleurs (telles que les arbres d'ombrage et à fleurs, les plantes ornementales ligneuses, le chanvre, le cannabis, les fleurs ornementales)	Traitement des sols (en serre ou en plein air)	À n'importe quel stade de la croissance	Appliquer 5 ml de produit pour 100 m ² de couvert végétal	Vérifier la compatibilité avec d'autres produits de traitement du sol utilisés dans le même réservoir. Appliquer par pulvérisation, chimigation, goutte à goutte ou autre. Renouveler l'application une fois par mois ou selon les besoins jusqu'à 13 fois par an.
	Pulvérisation foliaire (en serre ou à l'extérieur)	Jusqu'à une semaine avant la récolte	Appliquer 10 ml de produit pour 100 m ² de couvert végétal	Utiliser un volume de pulvérisation minimal pour couvrir le couvert végétal. Pour de meilleurs résultats, pulvériser le dessus et le dessous des feuilles. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 26 fois par an.

CULTURE	MÉTHODE D'APPLICATION	PÉRIODE D'APPLICATION	DOSE	COMMENTAIRES
Noix	Traitement des sols	Entre deux replantations ou à n'importe quel stade de la croissance (y compris en période de dormance)	Appliquer 1170 ml de produit par hectare	Vérifier la compatibilité avec d'autres produits de traitement des sols utilisés dans le même réservoir. Peut être appliqué par pulvérisation, chimigation ou d'autres moyens. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 13 fois par an.
	Foliaire (pulvérisation au sol, rotatif, etc.)	Dès la formation des bourgeons	Appliquer 440-1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 100 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins.
	Foliaire (aérien)	Dès la formation des bourgeons	Appliquer 440-1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 20 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins.
Fruits d'arbre (autres que les agrumes, tels que les pommes, les abricots, les pommiers, les loquats, les nectarines, les poires orientales, les pêches, les poires, les prunes, les pruneaux, les coings, les cerises douces, les cerises acides)	Traitement des sols	Entre deux replantations ou à n'importe quel stade de la croissance (y compris en période de dormance)	Appliquer 1170 ml de produit par hectare	Vérifier la compatibilité avec d'autres produits de traitement des sols utilisés dans le même réservoir. Peut être appliqué par pulvérisation, chimigation ou d'autres moyens. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 13 fois par an.
	Foliaire (pulvérisation au sol, rotatif, etc.)	Dès la formation des bourgeons	Appliquer 440-1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 100 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins.

CULTURE	MÉTHODE D'APPLICATION	PÉRIODE D'APPLICATION	DOSE	COMMENTAIRES
Fruits d'arbre (continuer)	Foliaire (aérien)	Dès la formation des bourgeons	Appliquer 440-1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 20 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins.
Légumes de plein champ ou de serre (artichauts, brocolis, choux de Bruxelles, choux, carottes, choux-fleurs, concombres, aubergines, ail, légumes-feuilles, oignons, citrouilles, courges, etc.)	Dans la raie de semis	À la plantation	Appliquer 580 ml de produit par hectare	Vérifier la compatibilité avec d'autres intrants pour raie du semis utilisés dans le même réservoir.
	Foliaire (pulvérisation au sol, rotatif, etc.)	Commencer dès 14 jours après la levée	Appliquer 440-1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 100 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 26 fois par an.
	Foliaire (aérien)	Commencer dès 14 jours après la levée	Appliquer 440 - 1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 20 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 26 fois par an.
Légumineuses (autres que le soya, telles que fèves, pois chiches, lentilles, pois, pois cajan, diverses espèces de Lupinus, divers haricots secs)	Dans la raie de semis	À la plantation	Appliquer 580 ml de produit par hectare	Vérifier la compatibilité avec d'autres intrants pour raie du semis utilisés dans le même réservoir.
	Foliaire (pulvérisation au sol, rotatif, etc.)	Commencer dès 14 jours après la levée	Appliquer 440-1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 100 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 26 fois par an.
	Foliaire (aérien)	Commencer dès 14 jours après la levée	Appliquer 440 - 1600 ml de produit par hectare	Utiliser au moins 20 litres de volume total de pulvérisation par hectare. Renouveler l'application une fois toutes les 2 semaines ou selon les besoins jusqu'à 26 fois par an.