Tidal Grow® FORTYRA™

Liquid Fungicide • Bactericide • Nematicide

Tidal Grow® Fortyra™ fortifies plant defenses and vigor to help suppress pests and diseases.

Active Ingredient: Chitosan	5.75%
Inert Ingredients: Vinegar, Water	94.25%
Total:	100.00%

Note: Product contains 0.496 lb of chitosan/gallon (0.0594 g of chitosan/mL).

CAUTION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Density: 8.62 lbs/gallon at 68°F

Net Contents / Net Weight:

1 Gallon (3.79 Liters)	8.62 lbs (3.91 kg)
2.5 Gallons (9.46 Liters)	21.55 lbs (9.77 kg)
265 Gallons (1,003.13 Liters)	2,284.30 lbs (1,036.14 kg)

This 25(b) product is exempt from registration with the Federal Environmental Protection Agency under FIFRA regulations.

FOR USE IN INDIANA AND MONTANA ONLY

--end of principal display panel--

SP1USA.0426.01.FTIM

FIRST AID	
IF INGESTED	Rinse mouth with water. Drink plenty of water.
IF ON SKIN OR CLOTHING	Remove contaminated clothing. Rinse skin thoroughly with soap and water.
IF INHALED	Move person to fresh air.
IF IN EYES	Rinse thoroughly with water for at least 15 minutes, lifting upper and lower eyelids. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

May cause eye and skin irritation. Avoid contact with skin and eyes. Wear safety glasses or goggles and chemical-resistant gloves when mixing or handling this product. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

Not for aquatic use. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high-water mark. Do not contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment wash waters.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal. Store in the original container in a cool, dry area, out of direct sunlight, and away from children and pets.

Do not reuse empty containers.

If empty: Offer for recycling if available or dispose of in a sanitary landfill.

If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions.

Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

CROP TOLERANCE

Plant tolerance may vary due to environmental conditions, crop variety, and application practices. Prior to large-scale application, treat a small area of the crop and observe any adverse effects.

PRODUCT INFORMATION

When used as directed, Tidal Grow® Fortyra™ supports plant vigor and quality, enhances tolerance to environmental stress, and aids in the suppression of certain plant pests and pathogens through activation of natural plant defense responses.

Tidal Grow® Fortyra™ is intended for use as part of an Integrated Pest Management (IPM) and crop health program and is not intended to replace conventional crop protection products.

ASSOCIATED PLANT DISEASES & PEST STRESS

When used preventatively or at early stages of pest or disease pressure, Tidal Grow® Fortyra™ may aid plants in tolerating or suppressing pressure associated with the following organisms:

Berries & Small Fruit Crop Group 13-07:

Small Fruit Vine Climbing Subgroup 13-07D, including grapes

Fungi: Powdery mildew (*Erysiphe necator*)

Vegetable Crops:

Fruiting Vegetables Crop Group 8-10, including tomato

Nematodes: Root-knot nematodes (*Meloidogyne* spp.)

Root and Tuber Vegetables Crop Group 1, including potato and sweet potato

Fungi: Early blight (*Alternaria solani*)

Nematodes: Root-knot nematodes (*Meloidogyne* spp.); Stubby root nematode (*Trichodorus and Paratrichodorus* spp.)

DIRECTIONS FOR USE:

Tidal Grow® Fortyra™ may be applied to labeled crops as a foliar spray, soil drench, root dip, in-furrow, or via chemigation through irrigation methods, including drip/trickle, center pivot, or sprinkler systems where applicable. Tidal Grow® Fortyra™ may be applied to crops before planting, at planting, pre-emergence, post-emergence, and during the growing season. The recommended application rate and timing depend on the crop and level of pest disease pressure. For best results, apply early in the morning or late in the afternoon.

Tidal Grow® Fortyra™ can be tank mixed with most other fungicides, insecticides, herbicides, liquid fertilizers, adjuvants, and additives; however, not all combinations or environmental conditions have been tested. The pH of the mix water should be below 7 for best results; if mix water is above pH 7, precondition with acidifier to a pH of 5–6.5. Use spray blends immediately. Do not let blends that contain Tidal Grow® Fortyra™ sit unagitated for extended periods of time. Perform a compatibility jar test prior to mixing with other chemicals, especially for concentrated aerial applications.

Jar test tips: If using mix water with pH greater than 7, first reduce the pH of your mix water to pH 5. Add half the water, then water conditioners, followed by dry products, continuous agitation, liquids (including suspension concentrates and suspo-emulsions), emulsifiable concentrates, solution liquids

(including Tidal Grow® Fortyra™) and finally surfactants. For products like copper fungicides, adjust the pH accordingly to prevent phytotoxicity within the label instructions. If the first jar test fails, the order of input mixing or pre-diluting partner products may be changed before adding.

Combining Tidal Grow® Fortyra™ with anionic polymers tends to cause clumping, gelling, or settling. Example: Tidal Grow® Fortyra™ should not be mixed with ammonium polyphosphate fertilizers (10-34-0 and 11-37-0).

To ensure chemical compatibility and prevent crop injury, it is advised to test the combinations on a small portion of the crop to be treated.

Contact a representative from Tidal Grow® AgriScience for more information on compatibility.

APPLICATION METHOD	APPLICATION TIMING	RATE PER APPLICATION	COMMENTS
Soil Treatment	Apply at planting or during early crop establishment. May be repeated during the growing season as needed to support suppression of nematodes and soilborne pathogens.	12-22 fl oz / acre	Apply in-furrow, as soil drench, or via chemigation through irrigation systems, including drip irrigation. Use sufficient water volume to ensure uniform distribution in the root zone.
Foliar (Ground or Aerial Application)	Apply preventively or at early pest or disease development. May be applied throughout the growing season as needed based on pest or disease pressure.	8-22 fl oz / acre	Apply using ground application with a minimum of 5 GPA spray volume. Ensure thorough and uniform coverage of the crop canopy. Repeat as needed based on pest or disease pressure. Apply by aerial application using a

			minimum of 2 GPA spray volume. Repeat at 14 days intervals or as needed based on pest or disease pressure.

IMPORTANT: Additional Operating Instructions for Chemigation for Washington State. Review your state and local regulatory requirements before applying any agricultural chemical through an irrigation system.

DIRECTIONS FOR USE FOR CHEMIGATION:

Irrigation Systems: Refer to Tidal Grow® Fortyra™ application rates listed previously through any type of irrigation system such as pivot or overhead sprinklers. Always use a backflow prevention valve (check-valve) when injecting into irrigation systems.

GENERAL DIRECTIONS FOR CHEMIGATION:

- Calibrate the irrigation and injection system before applying Tidal Grow® Fortyra™. Calibrate the injection pump with the irrigation system fully charged at the desired operating pressure. If you have questions about calibration, you should contact state extension specialists, equipment manufacturers, or other experts.
- A person knowledgeable of the chemigation system and responsible for its operation, or under the supervision of the responsible person, shall start up, operate, or shut down the system and make necessary adjustments should the need arise.
- Check the irrigation system to ensure uniform application of water. The chemigation system, which is inclusive of the irrigation equipment and chemigation apparatus, must be properly maintained.
- Do not apply when system connections or fittings leak or when emitters or sprinkler heads are not properly functioning.
- The injection unit and supply tank should be equipped with an in-line strainer with a 100-mesh or larger screen positioned between the supply tank and the injection pump. Dispose of any residue in accordance with Local and State laws.
- The irrigation system must contain a functional check valve, vacuum relief valve, inspection port, and low-pressure drain that are appropriately sized and located on the irrigation mainline to prevent water source contamination from backflow. The pesticide injection line must contain a functional, automatic, quick-closing check valve to prevent the flow of fluid back toward the injection pump. The pesticide injection line must also contain a functional, normally closed solenoid-operated valve located on the intake side of the injection pump and connected to the system interlock to prevent fluid from being withdrawn from the supply tank when the irrigation system is either automatically or manually shutdown. The system must contain functional interlocking controls to automatically shut off the pesticide injection pump when the water

pump motor stops. The irrigation mainline or water pump must include a functional pressure switch that will stop the water pump motor when the water pressure decreases to the point where pesticide distribution is adversely affected. Systems must use a metering pump, such as a positive displacement injection pump (e.g., diaphragm or piston pump), effectively designed and constructed of materials that are compatible with pesticides and capable of being fitted with a system interlock.

- Add the specified amount of Tidal Grow® Fortyra™ to the water in the supply tank. Application should be in sufficient water and of sufficient duration to apply the recommended rate evenly.
- Start the water pump and irrigation system, allowing the desired pressure to be achieved throughout the irrigation system before starting the injection process.
- Apply continuously for the duration of the application period.
- Do not allow irrigation water to collect or run-off during chemigation and pose a hazard to workers, bystanders, livestock, wells, or adjoining crops.
- Once the application is completed, thoroughly flush the entire irrigation and injection system with untreated water before turning off the irrigation system. To ensure the lines are flushed and free of this product, a dye indicator may be injected into the lines to mark the end of the application period.
- Wear required Personal Protective Equipment when adjusting or repairs on the chemigation system when Tidal Grow® Fortyra™ is in the irrigation water or residue may be present.
- Do not apply when windspeed favors drift beyond the area intended for treatment. Do not apply when wind speed favors drift, when system connection or fittings leak, when sprinkler heads or emitters do not provide uniform distribution, or when lines containing the product must be dismantled and drained.

USING WATER FROM PUBLIC WATER SYSTEMS:

Public water system means a system for the provision to the public of piped water for human consumption if such system has at least 15 service connections or regularly serves an average of at least 25 individuals daily at least 60 days out of the year. Chemigation systems connected to public water systems must contain a functional, reduced-pressure zone (RPZ), backflow preventer, or the functional equivalent in the water supply line upstream from the point of pesticide introduction. As an option to the RPZ, the water from the public water system should be discharged into a reservoir tank prior to pesticide introduction. There shall be a complete physical break (air gap) between the flow outlet end of the fill pipe and the top or overflow rim of the reservoir tank of at least twice the inside diameter of the fill pipe.

- Do not connect an irrigation system (including greenhouse systems) used for pesticide application to a public water system unless the above label-prescribed safety devices for public water supplies are in place.

PRECAUTION: Use of the product in accordance with label directions is not expected to adversely affect normal vegetative and/or reproductive growth in most situations. However, various environmental and agronomic factors, such as crop stress associated with high temperatures and/or dry conditions, make it impossible to eliminate all risks associated with the use of the product; therefore, crop injury is always possible. The user assumes all risks of use and handling. Use in accordance with recommendations of a

qualified individual or institution, such as, but not limited to, a certified crop advisor, agronomist, university crop extension publication, or apply according to recommendations in your approved nutrient management plan. Consult your local Tidal Grow® AgriScience company representative for further information.

MANUFACTURED AND GUARANTEED BY:

Tidal Vision Products, Inc. DBA Tidal Grow® AgriScience
3710 Iron Gate Road, Bellingham, WA 98226 USA
TidalGrowAg.com | +1 360-603-7676

Tidal Grow® FORTYRA™

Fungicida líquido • Bactericida • Nematicida

Tidal Grow® Fortyra™ fortalece las defensas de la planta y su vigor para ayudar a suprimir plagas y enfermedades.

Ingrediente activo: Quitosano	5.75 %
Ingredientes inertes: Vinagre, agua	94.25 %
Total:	100.00 %

Nota: El producto contiene 0.496 lb de quitosano/galón (0.0594 g de quitosano/ml).

PRECAUCIÓN

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Densidad: 8.62 lb/galón a 68 °F

Contenido neto / Peso neto:

1 galón (3.79 litros)	8.62 lb (3.91 kg)
2.5 galones (9.46 litros)	21.55 lb (9.77 kg)
265 galones (1,003.13 litros)	2,284.30 lb (1,036.14 kg)

Este producto 25(b) está exento de registro ante la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos bajo las regulaciones FIFRA.

PARA USO ÚNICAMENTE EN INDIANA Y MONTANA

--fin del panel principal--

SP1USA.0426.01.FTIM

PRIMEROS AUXILIOS	
SI SE INGIERE	Enjuague la boca con agua. Beba abundante agua.
SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA	Quítese la ropa contaminada. Enjuague bien la piel con agua y jabón.
SI SE INHALA	Traslade a la persona a un lugar con aire fresco.
SI ENTRA EN LOS OJOS	Enjuague cuidadosamente con agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior. Retire los lentes de contacto, si los hay, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Puede causar irritación en los ojos y la piel. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de seguridad o protectores oculares y guantes resistentes a químicos al mezclar o manipular este producto. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño.

PELIGROS AMBIENTALES

No es para uso acuático. No aplique directamente al agua, a áreas donde haya agua superficial o a zonas intermareales por debajo de la marca promedio de marea alta. No contamine el agua al limpiar el equipo ni al desechar el agua de lavado del equipo.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos o los forrajes mediante el almacenamiento o la eliminación. Almacene en el envase original en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa y lejos de los niños y mascotas.

No reutilice los envases vacíos.

Si está vacío: Ofrézcalo para reciclaje si está disponible o deséchelo en un relleno sanitario.

Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de residuos sólidos para obtener instrucciones de eliminación.

Nunca vierta el producto no utilizado en ningún desagüe interior o exterior.

TOLERANCIA DEL CULTIVO

La tolerancia de las plantas puede variar debido a las condiciones ambientales, la variedad del cultivo y las prácticas de aplicación. Antes de una aplicación a gran escala, trate un área pequeña del cultivo y observe cualquier efecto adverso.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Cuando se usa según las instrucciones, Tidal Grow® Fortyra™ favorece el vigor y la calidad de la planta, mejora la tolerancia al estrés ambiental y ayuda en la supresión de ciertas plagas y patógenos vegetales mediante la activación de las respuestas naturales de defensa de la planta.

Tidal Grow® Fortyra™ está destinado a usarse como parte de un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) y salud del cultivo, y no está destinado a reemplazar productos convencionales de protección de cultivos.

ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS Y ESTRÉS POR PLAGAS ASOCIADOS

Cuando se utiliza de forma preventiva o en etapas tempranas de presión de plagas o enfermedades, Tidal Grow® Fortyra™ puede ayudar a las plantas a tolerar o suprimir la presión asociada con los siguientes organismos:

Grupo de cultivos de bayas y frutos pequeños 13-07:

Subgrupo 13-07D: frutos pequeños de vid trepadora, incluidas las uvas

Hongos: Oídios (*Erysiphe necator*)

Cultivos de verduras:

Grupo de cultivos de verduras de fruto 8-10, incluido el tomate

Nematodos: Nematodos agalladores (*Meloidogyne spp*.)

Grupo de cultivos de raíces y tubérculos 1, incluidos la papa y el camote

Hongos: Tizón temprano (*Alternaria solani*)

Nematodos: Nematodos agalladores (*Meloidogyne spp*.); nematodos de raíz corta (*Trichodorus y Paratrichodorus* spp.)

INSTRUCCIONES DE USO:

Tidal Grow® Fortyra™ puede aplicarse a los cultivos indicados como aspersión foliar, riego al suelo, inmersión de raíces, en surco o mediante quimigación a través de métodos de riego, incluidos goteo, pivote central o sistemas de aspersión, según corresponda. Tidal Grow® Fortyra™ puede aplicarse a los cultivos antes de la siembra, en la siembra, en preemergencia, en postemergencia y durante la temporada de crecimiento. La dosis y el momento de aplicación recomendados dependen del cultivo y del nivel de presión de plagas o enfermedades. Para obtener mejores resultados, aplique temprano por la mañana o al final de la tarde.

Tidal Grow® Fortyra™ puede mezclarse en tanque con la mayoría de otros fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes líquidos, coadyuvantes y aditivos; sin embargo, no todas las combinaciones o condiciones ambientales han sido evaluadas. El pH del agua de mezcla debe ser inferior a 7 para obtener mejores resultados; si el agua de mezcla es superior a pH 7, acondicione previamente con un acidificante a un pH de 5 a 6.5. Use las mezclas de aspersión inmediatamente. No deje reposar sin agitación durante períodos prolongados las mezclas que contengan Tidal Grow® Fortyra™. Realice una prueba de compatibilidad en frasco antes de mezclar con otros productos químicos, especialmente para aplicaciones aéreas concentradas.

Consejos para la prueba en frasco: Si utiliza agua de mezcla con pH mayor a 7, primero reduzca el pH del agua de mezcla a pH 5. Agregue la mitad del agua, luego los acondicionadores de agua, seguidos de los productos secos, con agitación continua, luego los líquidos (incluidos concentrados en suspensión y suspoemulsiones), concentrados emulsionables, soluciones líquidas (incluido Tidal Grow® Fortyra™) y finalmente los surfactantes. Para productos como fungicidas a base de cobre, ajuste el pH según corresponda para evitar fitotoxicidad conforme a las instrucciones de la etiqueta. Si la primera prueba en frasco falla, se puede cambiar el orden de mezcla o la predilución de los productos antes de agregarlos.

La combinación de Tidal Grow® Fortyra™ con polímeros aniónicos tiende a causar grumos, gelificación o sedimentación. Ejemplo: Tidal Grow® Fortyra™ no debe mezclarse con fertilizantes de polifosfato de amonio (10-34-0 y 11-37-0).

Para asegurar la compatibilidad química y evitar daños al cultivo, se recomienda probar las combinaciones en una pequeña parte del cultivo a tratar.

Comuníquese con un representante de Tidal Grow® AgriScience para obtener más información sobre compatibilidad.

MÉTODO DE APLICACIÓN	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS POR APLICACIÓN	COMENTARIOS
Tratamiento del suelo	Aplicar en la siembra o durante el establecimiento temprano del cultivo. Puede repetirse durante la temporada de crecimiento según sea necesario para apoyar la supresión de nematodos y patógenos del suelo.	12-22 onzas líquidas / acre	Aplicar en surco, como riego al suelo o mediante quimigación a través de sistemas de riego, incluido riego por goteo. Use un volumen de agua suficiente para asegurar una distribución uniforme en la zona radicular.
Foliar (Aplicación terrestre o aérea)	Aplicar de forma preventiva o en etapas tempranas del desarrollo de plagas o enfermedades. Puede aplicarse durante toda la temporada de crecimiento según sea necesario en función de la presión de plagas o enfermedades.	8-22 onzas líquidas / acre	Aplicar mediante aplicación terrestre con un volumen mínimo de 5 GPA. Asegurar una cobertura completa y uniforme del dosel del cultivo. Repetir según sea necesario en función de la presión de plagas o enfermedades. Aplicar mediante aplicación aérea con un volumen mínimo de 2 GPA. Repetir a intervalos de 14 días o según sea necesario en función de la presión de plagas o enfermedades.

IMPORTANTE: Instrucciones operativas adicionales para quimigación en el estado de Washington. Revise los requisitos regulatorios estatales y locales antes de aplicar cualquier producto agrícola a través de un sistema de riego.

INSTRUCCIONES DE USO PARA QUIMIGACIÓN:

Sistemas de riego: Consulte las dosis de aplicación de Tidal Grow® Fortyra™ indicadas anteriormente para cualquier tipo de sistema de riego, como pivote o aspersores elevados. Siempre use una válvula de prevención de reflujo (válvula de retención) al inyectar en sistemas de riego.

INSTRUCCIONES GENERALES PARA QUIMIGACIÓN:

- Calibre el sistema de riego y de inyección antes de aplicar Tidal Grow® Fortyra™. Calibre la bomba de inyección con el sistema de riego completamente cargado a la presión de operación deseada. Si tiene preguntas sobre la calibración, debe comunicarse con especialistas de extensión estatal, fabricantes de equipos u otros expertos.
- Una persona conocedora del sistema de quimigación y responsable de su operación, o bajo la supervisión de la persona responsable, deberá iniciar, operar o apagar el sistema y realizar los ajustes necesarios si surge la necesidad.
- Verifique el sistema de riego para asegurar una aplicación uniforme del agua. El sistema de quimigación, que incluye el equipo de riego y el aparato de quimigación, debe mantenerse adecuadamente.
- No aplique cuando haya fugas en conexiones o accesorios del sistema o cuando los emisores o cabezales de aspersión no funcionen correctamente.
- La unidad de inyección y el tanque de suministro deben estar equipados con un colador en línea con una malla de 100 o superior, ubicado entre el tanque de suministro y la bomba de inyección. Deseche cualquier residuo de acuerdo con las leyes locales y estatales.
- El sistema de riego debe contener una válvula de retención funcional, una válvula de alivio de vacío, un puerto de inspección y un drenaje de baja presión, de tamaño y ubicación adecuados en la línea principal de riego para evitar la contaminación de la fuente de agua por reflujo. La línea de inyección del pesticida debe contener una válvula de retención automática funcional de cierre rápido para evitar el flujo de fluido de regreso hacia la bomba de inyección. La línea de inyección del pesticida también debe contener una válvula operada por solenoide, normalmente cerrada y funcional, ubicada en el lado de entrada de la bomba de inyección y conectada al sistema de interbloqueo para evitar que el fluido sea extraído del tanque de suministro cuando el sistema de riego se apague automática o manualmente. El sistema debe contener controles de interbloqueo funcionales para apagar automáticamente la bomba de inyección del pesticida cuando se detenga el motor de la bomba de agua. La línea principal de riego o la bomba de agua debe incluir un interruptor de presión funcional que detenga el motor de la bomba de agua cuando la presión del agua disminuya hasta el punto en que la distribución del pesticida se vea afectada negativamente. Los sistemas deben usar una bomba dosificadora, como una bomba de inyección de desplazamiento positivo (por ejemplo, bomba de diafragma o de pistón), diseñada

y construida con materiales compatibles con pesticidas y capaz de conectarse a un sistema de interbloqueo.

- Agregue la cantidad especificada de Tidal Grow® Fortyra™ al agua en el tanque de suministro. La aplicación debe realizarse con suficiente agua y durante el tiempo necesario para aplicar la dosis recomendada de manera uniforme.
- Inicie la bomba de agua y el sistema de riego, permitiendo que se alcance la presión deseada en todo el sistema antes de comenzar el proceso de inyección.
- Aplique de manera continua durante todo el período de aplicación.
- No permita que el agua de riego se acumule o genere escorrentía durante la quimigación, lo que podría representar un riesgo para trabajadores, personas cercanas, ganado, pozos o cultivos adyacentes.
- Una vez finalizada la aplicación, enjuague completamente todo el sistema de riego e inyección con agua sin tratar antes de apagar el sistema de riego. Para asegurar que las líneas estén enjuagadas y libres de este producto, se puede inyectar un indicador de color en las líneas para marcar el final del período de aplicación.
- Use el equipo de protección personal requerido al realizar ajustes o reparaciones en el sistema de quimigación cuando Tidal Grow® Fortyra™ esté en el agua de riego o puedan existir residuos.
- No aplique cuando la velocidad del viento favorezca la dispersión fuera del área destinada al tratamiento. No aplique cuando la velocidad del viento favorezca la dispersión, cuando haya fugas en conexiones o accesorios del sistema, cuando los cabezales de aspersión o emisores no proporcionen una distribución uniforme o cuando las líneas que contienen el producto deban desmontarse y drenarse.

USO DE AGUA DE SISTEMAS PÚBLICOS:

Sistema público de agua significa un sistema que suministra agua al público mediante tuberías para consumo humano, siempre que dicho sistema tengaal menos 15 conexiones de servicio o atiende regularmente a un promedio de al menos 25 personas diariamente durante al menos 60 días al año. Los sistemas de quimigación conectados a sistemas públicos de agua deben contar con un dispositivo funcional de prevención de reflujo de zona de presión reducida (RPZ), o un dispositivo funcionalmente equivalente, instalado en la línea de suministro de agua aguas arriba del punto de introducción del plaguicida. Como alternativa al RPZ, el agua del sistema público debe descargarse en un tanque de reserva antes de la introducción del plaguicida. Debe existir una separación física completa (espacio de aire) entre el extremo de salida de la tubería de llenado y la parte superior o el borde de desbordamiento del tanque de reserva. Esta separación debe ser de al menos el doble del diámetro interno de la tubería de llenado.

- No conecte un sistema de riego (incluidos sistemas de invernadero) utilizado para la aplicación de plaguicidas a un sistema público de agua a menos que estén en su lugar los dispositivos de seguridad prescritos en la etiqueta para suministros públicos de agua.

PRECAUCIÓN: El uso del producto de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta no se espera que afecte negativamente el crecimiento vegetativo o reproductivo normal en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, diversos factores ambientales y agronómicos, como el estrés del cultivo asociado con altas temperaturas y/o condiciones secas, hacen imposible eliminar todos los riesgos asociados con el uso del

producto; por lo tanto, siempre es posible que ocurra daño al cultivo. El usuario asume todos los riesgos de uso y manejo. Use de acuerdo con las recomendaciones de una persona o institución calificada, como, entre otros, un asesor certificado de cultivos, un agrónomo, publicaciones de extensión universitaria o conforme a las recomendaciones de su plan aprobado de manejo de nutrientes. Consulte a su representante local de Tidal Grow® AgriScience para obtener más información.

FABRICADO Y GARANTIZADO POR:
Tidal Vision Products, Inc. DBA Tidal Grow® AgriScience
3710 Iron Gate Road, Bellingham, WA 98226
EE. UU.
TidalGrowAg.com | +1 360-603-7676